

 <p>PIRAQUARA PREFEITURA Secretaria de Saúde de Piraquara</p>	Departamento de Atenção à Saúde Telefone: (41) 3590 3723 saude.mulher@piraquara.pr.gov.br		Divisão de Saúde da Mulher
			Código: POP SMU 13
	TESTE DAS AMINAS - KOH		Revisão: 11/04/2023
	Elaborador: Enfª Ramony Filippini Martins	Revisor: Enf. Mayara Deina Menta	Data da elaboração: junho/2019
Aprovador: Comissão de Padronização dos Serviços de Saúde		Quantidade de Páginas: 3	

1. INTRODUÇÃO

Um dos métodos diagnósticos para corrimento vaginal é o Teste de Whiff (teste das aminas ou “do cheiro”), onde coloca-se uma gota de KOH a 10% sobre o conteúdo vaginal depositado numa lâmina de vidro. Se houver “odor de peixe”, o teste é considerado positivo e sugestivo de vaginose bacteriana.

2. EXECUTORES

- ✓ Médico Ginecologista/Obstetra, Médico da Estratégia de Saúde da Família e Enfermeiro.

3. OBJETIVOS

- ✓ Nortear os profissionais na realização e interpretação do teste;
- ✓ Diagnosticar vaginose bacteriana de forma rápida para auxiliar no tratamento precoce.

4. MATERIAIS

- ✓ Espéculo vaginal;
- ✓ Espátula;
- ✓ Lâmina;
- ✓ Luvas de procedimento;
- ✓ Solução de KOH 10%;
- ✓ Foco de luz;

5. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

5.1 Como é realizado o exame:

- ✓ Realizar anamnese da paciente;
- ✓ Preparar todo o material;
- ✓ Verificar a ambiência da sala de forma a preservar a privacidade da paciente, trancar a porta;
- ✓ Posicioná-la sobre a maca ginecológica;
- ✓ Introduza o espéculo vaginal e inicie avaliação do conteúdo vaginal (quantidade, coloração e consistência) e do colo uterino (sinais de processo inflamatório);
- ✓ Usando uma espátula, colete a amostra do corrimento da parede vaginal;
- ✓ Adicione parte da amostra na lâmina;
- ✓ Adicione 1-2 gotas de solução de KOH 10%;

 <p>PIRAQUARA PREFEITURA Secretaria de Saúde de Piraquara</p>	Departamento de Atenção à Saúde Telefone: (41) 3590 3723 saude.mulher@piraquara.pr.gov.br		Divisão de Saúde da Mulher
	TESTE DAS AMINAS - KOH		Código: POP SMU 13
	Elaborador: Enfª Ramony Filippini Martins	Revisor: Enf. Mayara Deina Menta	Revisão: 11/04/2023
	Aprovador: Comissão de Padronização dos Serviços de Saúde		Data da elaboração: junho/2019
			Quantidade de Páginas: 3

- ✓ Com ajuda da espátula, misture a amostra coletada com a solução;
- ✓ Espalhe a mistura na lâmina e aguarde a reação;

5.2 Interpretação do resultado:

- ✓ Iniciar a leitura imediatamente após início da reação da solução de KOH e da secreção vaginal;
- ✓ O teste será positivo quando o odor for sugestivo de “peixe podre”, resultado da reação química que elimina putrescina e cadaverina.

6. OBSERVAÇÕES

- ✓ Gestantes com queixa de corrimento realizar sempre o especular com Teste KOH;
- ✓ Gestantes entre 24 e 28 semanas, realizar obrigatoriamente pelo menos um especular com teste de KOH 10% para diagnosticar corrimentos que possam desencadear Trabalho de Parto prematuro;
- ✓ Em casos de grande conteúdo vaginal o teste pode ser realizado no próprio espéculo.

6.1 Condições de estocagem e manipulação:

- ✓ Armazenar o frasco que contém a solução de KOH 10% em local seco e fresco;
- ✓ Manter o líquido armazenado na embalagem original;
- ✓ Datar a abertura do frasco;
- ✓ Não utilizar após a data de validade.

6.2 Indicação:

- ✓ Gestantes com sinais/sintomas ginecológicos, em qualquer tempo da gestação;
- ✓ Gestantes entre 24 e 28 semanas de gestação (OBRIGATORIAMENTE);
- ✓ Mulheres com queixas ginecológicas;
- ✓ Se visualização de sinais durante a coleta de citopatológico de colo de útero.

6.3 Tratamento:

6.3.1 Vaginose Bacteriana

 PIRAQUARA PREFEITURA Secretaria de Saúde de Piraquara	Departamento de Atenção à Saúde Telefone: (41) 3590 3723 saude.mulher@piraquara.pr.gov.br		Divisão de Saúde da Mulher
			Código: POP SMU 13
	TESTE DAS AMINAS - KOH		Revisão: 11/04/2023
	Elaborador: Enfª Ramony Filippini Martins	Revisor: Enf. Mayara Deina Menta	Data da elaboração: junho/2019
Aprovador: Comissão de Padronização dos Serviços de Saúde			Quantidade de Páginas: 3

Primeira Opção	Metronidazol 250 mg	2 comp. VO, de 12/12h, por 7 dias
	Metronidazol creme vaginal	1 medida do aplicador deverá ser aplicada a noite, por 7 dias
Segunda Opção	Clindamicina 300mg	1 comp. 2x/dia, por 7 dias.

- ✓ Em caso de **teste negativo**, com corrimento grumoso e eritema vulvar tratar como candidíase (Miconazol creme 2% via vaginal por 07 dias); **EM GESTANTES E LACTANTES SOMENTE TRATAR COM CREME VAGINAL, não usar medicamento via oral.**

7. HISTÓRICO DE REVISÃO DO POP

Nº da Revisão	Item	Alteração	Data da alteração
02	Introdução; objetivos; materiais; observações	Acrescentada introdução; Acrescentados os objetivos; Acrescentados os materiais utilizados; Acrescentadas informações em observações;	11/04/2023

8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais. Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Atenção Integral às Pessoas com Infecções Sexualmente Transmissíveis / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais. – Brasília : Ministério da Saúde, 2015. 120 p. : il.

BRASIL. Ministério da saúde. Intituto Sírio-Libanês de Ensino e Pesquisa. Protocolos de Atenção Básica: Saúde das Mulheres. Brasília, 2015.